

PARODONTOSE (TANDKØDSBETÆNDELSE)

Hvad er parodontose?

Parodontose starter i de fleste tilfælde som let tandkødsbetændelse (kaldet gingivitis). Hvis denne tandkødsbetændelse ikke behandles i tide, kan der opstå dannelser af tandkødslommer (pocher). Det er sådan, parodontose udvikles. Parodontose er meget ubehageligt, æstetisk udfordrende og kan også være smertefuldt. Parodontose nedbryder den knogle, der holder tænderne fast. Nedbrydningen af knoglen kan i værste fald medføre, at tænderne falder ud.

Hvorfor får man parodontose?

Parodontose starter i de fleste tilfælde som almindelig, let tandkødsbetændelse (gingivitis). Følgende faktorer kan medvirke parodontosen:


- Dårlig mundhygiejne
- Rygning
- Stress
- Svækket immunforsvar
- Genetiske faktorer



PARODONTOSE (TANDKØDSBETÆNDELSE)

Hvordan behandles parodontose?

Parodontose skal behandles hos tandlægen eller tandplejeren. Her fjernes de tandsten og det belægning, der indeholder bakterier fra tænderne og fra pocherne (tandkødslommerne). Efterfølgende skal man selv opretholde en god mundhygiejne. Parodontosepatienter skal genbehandles regelmæssigt, i langt de fleste tilfælde hver tredje måned. Hvis parodontosen er meget udbredt, kan en tandkødsoperation hos tandlægen være nødvendig. Her kan man enten genopbygge knoglen ved siden af parodontoseramte tænder, eller man kan fjerne dele af tandkødet, så den resterende del er nemmere at holde ren. Det er vigtigt at huske, at man ikke kan få den mistede del af knoglen tilbage, der er kun tale om en delvis genopbyggelse med kirurgisk behandling. Derfor skal parodontose behandles i tide, så det bliver stoppet så tidligt som muligt, og så man dermed undgår et mere omfattende indgreb.



Her ses udviklingen af parodontose. Det sunde tandsæt begynder at blive irriteret og betændt. Senere begynder pochedannelsen, og den omkringliggende knogle nedbrydes. I værste tilfælde kan den nedbrydes så meget, at tænderne ikke længere kan sidde fast.